



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'
ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari**

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su barbabietola da zucchero, da seme e da foraggio ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **UNIVOQ** reg. n. 18181, contenente le sostanze attive *fenpicoxamid e protioconazolo*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente " Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza degli alimenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenente le sostanze attive *fenpicoxamid* e *protioconazolo* per l'utilizzo su barbabietola da zucchero, da seme e da foraggio contro *Cercospora beticola*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell' Impresa Corteva Agriscienze Italia s.r.l., con sede legale in Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su barbabietola da zucchero, da seme e da foraggio contro *Cercospora beticola*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario UNIVOQ, contenente le sostanze attive *fenpicoxamid* e *protioconazolo*;

VISTO il decreto del 8 marzo 2023 con il quale è stato registrato al n. 18181 il prodotto fitosanitario denominato UNIVOQ, contenente le sostanze attive *fenpicoxamid* e *protioconazolo*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su barbabietola da zucchero, da seme e da foraggio contro *Cercospora beticola* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 1 aprile 2026 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 2 aprile 2026 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su barbabietola da zucchero, da seme e da foraggio contro *Cercospora beticola* per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **UNIVOQ** registrato al n. 18181 contenente le sostanze attive ***fenpicoxamid e protioconazolo***, a nome dell'Impresa **Corteva Agriscience Italia s.r.l.**, con sede legale in Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it, e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, lì 20 aprile 2026

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”*

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI
Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLO
Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

UNIVOQ®

Fungicida sistemico ad ampio spettro per il controllo delle malattie fogliari e della spiga di frumento, tritiale, farro, segale e barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme*

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Meccanismo d'azione: Gruppo C4#21 e G1#3 (FRAC)

Composizione di UNIVOQ

Fenpicoxamid (nome commerciale INATREQ™ active) puro 4,79 g

(pari a 50 g/l)

Protiokonazolo puro 9,58 g (pari a 100 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene: Massa di reazione di N,N dimetil decano-1-amide e N,N-dimetil octanamide; Cicloesanone; Alcol etossilati, da C12 a C15; Etilsanolo



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: **H315:** Provoca irritazione cutanea. **H318:** Provoca gravi lesioni oculari. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P261:** Evitare di respirare fumi/vapori/spray. **P264:** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P270:** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P302+P352:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310:** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P391:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscience Italia S.r.l. – Mozzanica (BG) (Italia)

Corteva Agriscience France S.A.S. – Cernay – Francia

Corteva Agriscience LLC – Valdosta – USA

Chemark Kft – Peremarton gyártelep – Ungheria

Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG) – Italia

Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA) – Italia

Phyteurop – Montreuil Bellay - Francia

Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) – Italia (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5,2 - 6 - 6,2 - 7 - 7,5 - 15 - 20 - 60 litri

Registrazione n. 18181 del 08/03/23 del Ministero della Salute

Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Indossare tutta intera da lavoro e guanti durante la manipolazione del prodotto. Utilizzare una protezione per gli occhi durante la manipolazione del concentrato. Durante le operazioni di raccolta manuale e di rimozione delle barbabietole con fioritura precoce indossare indumenti da lavoro (braccia, corpo e gambe coperti) e guanti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per applicazioni su cereali e barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme*: Per proteggere gli organismi acquatici mantenere le seguenti misure di mitigazione nei confronti dei corpi idrici superficiali:

- fascia di rispetto vegetata di 10 m in abbinamento all'utilizzo di attrezzature che riducono la deriva del 75%, oppure
- fascia di rispetto vegetata di 10 m in abbinamento all'utilizzo della manica d'aria.

Per applicazioni su cereali: Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non usare in loro presenza. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Durante la fase di fioritura applicare il prodotto alle prime ore del mattino o dopo il tramonto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio chiamare i servizi di emergenza o un'ambulanza, poi praticare la respirazione

artificiale; per praticare la respirazione bocca a bocca, il soccorritore deve utilizzare un'adeguata protezione (ad es. una maschera tascabile). **Contatto con la pelle:** Togliere immediatamente l'abbigliamento contaminato. Sciacquare subito con abbondante acqua per 15-20 minuti. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente e continuamente con acqua corrente per almeno 30 minuti. Togliere eventuali lenti a contatto dopo i primi 5 minuti e continuare a sciacquare. **Ingestione:** Far sorseggiare un bicchiere d'acqua se la persona è capace di inghiottire. Non indurre il vomito a meno che non sia indicato dal centro antiveneni o dal medico. **Note per il medico:** Mantenere un livello adeguato di ventilazione e somministrazione di ossigeno al paziente. Può causare sintomi simili all'asma (vie respiratorie reattive). Broncodilatatori, espettoranti, anti tosse e corticosteroidi possono essere di aiuto. Possono manifestarsi sintomi di carattere respiratorio, incluso edema polmonare, con effetto ritardato. Le persone che sono sottoposte ad una esposizione significativa, dovrebbero essere tenute in osservazione per 24-48 ore, in caso si manifestassero eventuali problemi respiratori. Delle ustioni chimiche degli occhi possono richiedere un lavaggio prolungato. Consultare immediatamente il medico, di preferenza un oculista. Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi ed alle condizioni cliniche del paziente. Tenere a portata di mano la Scheda di Sicurezza e, se disponibile, il contenitore del prodotto o l'etichetta quando si ci rivolge ad un centro antiveneni o ad un medico per il trattamento. L'esposizione eccessiva può aggravare asma e altre disfunzioni respiratorie preesistenti (p.es. enfisema, bronchiti, sindrome reattiva di disfunzione delle vie respiratorie).

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

UNIVOQ è un fungicida in formulazione liquida composto dalla miscela di fenpicoxamid (INATREQ™ active), principio attivo appartenente al gruppo C4#21 nella classificazione FRAC (inibizione respirazione a livello complesso III, fungicidi QiI) e protioconazolo, fungicida triazolintione appartenente al gruppo G1#3 nella classificazione FRAC (inibizione biosintesi degli steroli, fungicidi IBS).

UNIVOQ è un fungicida sistemico translaminare dotato di attività preventiva e curativa e si distingue per la flessibilità e durata d'azione nei confronti di numerose malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali a paglia e della barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme*.

USI AUTORIZZATI, DOSI ED EPOCA DI IMPIEGO

UNIVOQ è impiegato per il controllo delle malattie fungine delle colture e ai dosaggi elencati nella seguente tabella:

Coltura	Malattia	Dose (L/Ha)	Numero massimo di trattamenti per anno
Frumento (duro, tenero), e farro	Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Ruggini , (<i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i>) Elmintosporiosi (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	1,5 – 2,0	1
	Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.)	2,0	
Triticale	Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Ruggini , (<i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia triticina</i>) Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.)	1,5 – 2,0	1
	Fusariosi della spiga (<i>Fusarium</i> spp.)	2,0	
Segale	Ruggini , (<i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia recondita</i>)	1,5 – 2,0	1
Barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme*	Cercosporiosi (<i>Cercospora beticola</i>)	1,2 – 1,5	2

UNIVOQ va impiegato nei periodi critici di sviluppo delle malattie o intervenendo alla prima comparsa dei sintomi. Impiegare le dosi più alte sulle varietà più sensibili e nelle condizioni considerate più favorevoli allo sviluppo dei patogeni. L'ampio spettro d'azione e il dosaggio consentono il controllo simultaneo delle diverse malattie riportate in tabella, posizionando un trattamento da inizio levata (inizio allungamento primo internodo) alla fioritura per i cereali.

Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) intervenire con un trattamento al massimo del dosaggio consentito da fine spigatura a fioritura.

Per barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme * intervenire in maniera preventiva in condizioni predisponenti alla malattia dalla fase di copertura fogliare del 90% della superficie del terreno fino allo sviluppo completo della radice, rispettando un intervallo minimo tra i trattamenti di 21 giorni.

Impiegare il prodotto con volumi di acqua di 150-300 L/ha, adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione utilizzando barre irroratrici con ugelli a ventaglio tradizionali o antideriva. Si consiglia di usare almeno 200 L/ha di acqua quando si effettuano applicazioni alla spiga mirate al controllo delle fusariosi.

Piogge cadute dopo 1 ora dall'asciugatura completa del deposito umido sulle foglie non compromettono l'efficacia fungicida del trattamento.

(continua su pag. 2)

(UNIVOQ - continua da pag. 1)

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Riempire con acqua pulita circa metà del serbatoio dell'irroratrice, agitare la confezione del prodotto e versare la quantità desiderata di UNIVOQ direttamente nel serbatoio, mantenendo l'agitatore in funzione. In alternativa impiegare i sistemi di pre-miscelazione ove presenti. Sciacquare ripetutamente (almeno tre volte) il contenitore e versare nel serbatoio l'acqua di risciacquo. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate.

COMPATIBILITÀ

UNIVOQ è miscibile con gli insetticidi e gli agrofarmaci di più comune impiego ma in caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri e calce).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

UNIVOQ è una miscela di due sostanze attive aventi diverso meccanismo d'azione e pertanto rappresenta una buona soluzione per prevenire o ritardare l'insorgere di resistenze. E' buona norma impiegare UNIVOQ **preventivamente o nei primissimi stadi di sviluppo della malattia e con lo scrupoloso rispetto delle dosi e del numero massimo di trattamenti all'anno**. Utilizzare UNIVOQ come parte di una strategia di gestione integrata della resistenza che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione e che impieghi anche metodi di controllo agronomici.

Non applicare prodotti contenenti fenpicoxamid (INATREQ™ active) più di una volta per stagione sui cereali e più di due volte per stagione su barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme*.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la presenza di deriva sulle colture limitrofe non in etichetta. Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei casi di applicazioni su nuove varietà e/o di applicazioni in miscela con altri prodotti fitosanitari.

Intervallo di sicurezza: per barbabietola da zucchero, da foraggio e da seme* sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione risciacquando per bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). A questo scopo si raccomanda l'impiego di un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta di tale prodotto. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI

NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039 333 2107947 (24H)

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039 0372 709900 (O.U.)

VALIDITÀ REGISTRAZIONE:

* per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, DA FORAGGIO E DA SEME:
registrazione valida dal 20/04/2026 al 17/08/2026

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20.04.2026