

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 07 giugno 2024

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Comunicato regionale 3 giugno 2024 - n. 63

**Trattamenti obbligatori per il controllo scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma della flavescenza dorata della vite per l'anno 2024**

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce «Misure per il contenimento di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* all'interno di determinate aree delimitate»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto il d.d.s. del 16 giugno 2023 n. 9055 «Misure per il contenimento di *Grapevine Flavescence Dorée Phytoplasma* (fitoplasma agente della malattia nota come «Flavescenza dorata») in Lombardia»;

Preso atto che il citato Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1630 prevede all'articolo 4 l'applicazione di trattamenti adeguati al controllo del vettore della Flavescenza dorata della vite;

Dato atto che il presente comunicato verrà pubblicato sul BURL di Regione Lombardia;

### È FATTO OBBLIGO

**su tutto il territorio vitato regionale di effettuare i trattamenti insetticidi per il controllo di *Scaphoideus titanus*, vettore del fitoplasma della Flavescenza dorata della vite.**

Per la lotta al vettore della Flavescenza dorata della vite sono ammessi esclusivamente i prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'autorizzazione per la lotta alle cicaline della vite o specificamente al vettore *Scaphoideus titanus*.

In considerazione della preoccupante recrudescenza di Flavescenza dorata della vite osservata in molti areali viticoli del Nord Italia, nonché della nuova normativa comunitaria a seguito della quale l'organismo nocivo ad essa associato (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) è definito organismo da quarantena rilevante per l'Unione Europea, ai fini di tutelare il patrimonio viticolo lombardo, per l'anno in corso il numero dei trattamenti obbligatori previsti sull'intero territorio regionale è stabilito come segue:

- **OBBLIGO DI 3 TRATTAMENTI: in tutte le aziende con vigneti a produzione biologica, di cui al Reg. (UE) 2018/848.** Tale obbligo vige anche per le aziende non biologiche che intendono utilizzare esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per la produzione biologica.
- **OBBLIGO DI 2 TRATTAMENTI: in tutti i restanti vigneti del territorio regionale.**

### Quando effettuare i trattamenti

Alla luce dell'andamento stagionale e degli esiti dei monitoraggi sul territorio e in funzione delle tipologie aziendali, i trattamenti obbligatori dovranno essere eseguiti con le tempistiche di seguito riportate:

- tipologie aziendali per le quali è **obbligatorio eseguire 2 interventi**: primo trattamento **dal 14 al 25 giugno 2024**, secondo trattamento **dal 28 giugno al 9 luglio**, con un intervallo tra i due trattamenti di circa 14 giorni.
- tipologie aziendali per le quali è **obbligatorio eseguire 3 interventi**: primo trattamento **dal 14 al 25 giugno 2024**, i successivi ogni 12-14 giorni.

Si consiglia di utilizzare adeguati volumi d'acqua per consentire la completa bagnatura di tutte le piante, polloni compresi.

### SALVAGUARDIA DEI PRONUBI

Per salvaguardare gli insetti pronubi è obbligatorio rispettare il divieto di applicazione degli insetticidi nel periodo della fioritura della vite e quindi effettuare gli interventi insetticidi quando la stessa è già terminata. È inoltre vietato trattare anche qualora sia in fioritura la vegetazione sottostante, salvo che quest'ultima venga preventivamente sfalcata.

### Tracciabilità degli interventi obbligatori

Le aziende agricole devono tenere la tracciabilità dei trattamenti insetticidi sul registro dei trattamenti, mentre gli altri soggetti devono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi con le modalità previste dall'allegato 1 al presente comunicato, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale, conservando per i tempi prescritti dalla normativa vigente il documento fiscale rilasciato a seguito dell'acquisto del prodotto fitosanitario utilizzato.

### Possibilità di ridurre il numero di interventi obbligatori

Fermo restando l'esecuzione del primo trattamento obbligatorio, alla luce delle basse popolazioni del fitofago rinvenute in molte zone viticole lombarde nel corso dei monitoraggi condotti nel 2023, il Servizio fitosanitario valuterà la possibilità di concedere una deroga a livello comprensoriale per la riduzione del numero dei trattamenti insetticidi. Tale deroga dovrà essere richiesta inviando all'indirizzo [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it) un progetto relativo ad una o più aree omogenee all'interno di un comprensorio. Nelle aree individuate dovrà essere eseguito il monitoraggio di *Scaphoideus titanus* secondo le tempistiche e le metodiche riportate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente comunicato. Qualora il monitoraggio evidenziasse il superamento della soglia indicata nell'allegato 2, sarà obbligatorio procedere con ulteriori trattamenti insetticidi con prodotti ad azione abbattente (piretro nel caso delle aziende a produzione biologica).

### Controlli sull'esecuzione delle misure prescritte dal presente comunicato

Il Servizio fitosanitario si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione per accertare l'avvenuta esecuzione dei trattamenti obbligatori verificandone la tracciabilità.

### Mancata esecuzione dei trattamenti obbligatori

La mancata esecuzione delle disposizioni di cui al presente comunicato verrà perseguita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

### Obblighi per i produttori di materiale vivaistico della vite

Al fine di evitare la diffusione di Flavescenza dorata della vite tramite il materiale di moltiplicazione della vite, i vivaisti che presentano la denuncia annuale ai sensi del d.lgs. n. 16 del 2 febbraio 2021 hanno l'obbligo di seguire le seguenti disposizioni.

- **OBBLIGO DI 3 TRATTAMENTI nei barbatellai** inseriti nella denuncia annuale, effettuando il primo tra il 28 giugno ed il 9 luglio 2024 e i due successivi a distanza di circa 14 giorni l'uno dall'altro.
- **Posizionamento nei barbatellai di almeno 3 trappole cromotattiche ogni 0,5 ha per il monitoraggio di *Scaphoideus titanus***, da controllare e sostituire a cadenza almeno quindicinale. Le eventuali catture di adulti di scafoideo vanno registrate sulla scheda di cui all'allegato 2 del presente comunicato. Qualora nel corso dell'estate, successivamente ai trattamenti obbligatori, venisse superata la soglia di intervento indicata nell'allegato 2 sarà necessario effettuare un ulteriore intervento insetticida con una sostanza attiva ad azione abbattente. Le trappole sostituite andranno tenute separate e avvolte da pellicola trasparente, e devono essere conservate per un anno a disposizione per eventuali controlli.

**Nota bene.** Per contrastare la diffusione della malattia si ricorda la necessità di un tempestivo estirpo di tutte le piante sintomatiche e l'importanza di effettuare il monitoraggio aziendale del vettore tramite le trappole cromotattiche, anche come strumento di autovalutazione dell'efficacia dei trattamenti insetticidi.

Il controllo di *Scaphoideus titanus* deve essere effettuato anche sulle piante di vite situate in coltivazioni familiari e collocate all'interno di collezioni e orti botanici.

Ulteriori informazioni sulla malattia e sul suo vettore possono essere reperite sul sito del Servizio Fitosanitario Regionale, al seguente link:

<https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DeftaglioRedazionale/organismi-nocivi/virus-viroidi-e-fitoplasmi/red-flavescenza-sfr>

Per informazioni: [infofito@regione.lombardia.it](mailto:infofito@regione.lombardia.it)

Il dirigente  
Andrea Azzoni

ALLEGATO 1

**Registrazione trattamenti insetticidi per il controllo di *Scaphoideus titanus***

PROPRIETARIO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO: \_\_\_\_\_  
COMUNE: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE: \_\_\_\_\_  
ANNO \_\_\_\_\_

| Ubicazione vigneti / piante di vite |          |                    | Data<br>trattamento | Prodotto impiegato | Quantità<br>(Kg / L) |
|-------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Comune                              | Località | Superficie<br>(mq) |                     |                    |                      |
|                                     |          |                    |                     |                    |                      |
|                                     |          |                    |                     |                    |                      |
|                                     |          |                    |                     |                    |                      |



## ALLEGATO 2

**Tecniche di monitoraggio delle popolazioni di *Scaphoideus titanus***

Fermo restando l'esecuzione del primo trattamento obbligatorio, l'ente di riferimento per il comprensorio provvede ad inoltrare **tassativamente entro il 20 giugno** via mail al Servizio fitosanitario ([servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it](mailto:servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it)) l'intenzione di procedere nell'attività di monitoraggio. Ai fini della concessione di deroga per l'eventuale riduzione del numero degli interventi insetticidi, nella comunicazione deve essere specificato:

- l'area oggetto di monitoraggio;
- il numero di punti di conteggio delle forme giovanili di *S. titanus*;
- il numero e la georeferenziazione dei punti di installazione delle trappole cromotattiche per il monitoraggio degli adulti di *S. titanus*;
- il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate;

Il Servizio fitosanitario provvederà entro 5 giorni lavorativi a confermare o meno la deroga per la riduzione del numero dei trattamenti obbligatori

Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi al Servizio fitosanitario entro 7 giorni dal rilievo all'indirizzo [servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it](mailto:servizio.fitosanitario@regione.lombardia.it).

**Al fine di una corretta stima del livello della popolazione dell'insetto vettore, è obbligatorio effettuare sia il monitoraggio sulle forme giovanili che quello sugli adulti presenti nel vigneto considerato.**

A) Conteggio degli stadi giovanili di *S. titanus*.

Ai fini tecnico-pratici il metodo di campionamento utilizzato deve essere caratterizzato da elevata precisione, praticità e velocità di attuazione e per questo dovrà essere utilizzato il metodo di campionamento sequenziale messo a punto dal DIVAPRA Entomologia agraria dell'Università degli Studi di Torino.

In ogni vigneto devono essere eseguiti due campionamenti degli stadi giovanili di *S. titanus* (il primo dopo 7-10 giorni dal trattamento insetticida e il secondo dopo ulteriori 10-15 giorni), su un numero di piante per parcella tale da raggiungere la soglia riportata nella scheda di rilievo (Allegato 1).

Per ciascuna parcella conteggiare le forme giovanili (neanidi e ninfe) su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo (posizione basale); i dati vanno riportati sulla "Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*" che deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione per eventuali controlli.

Un risultato di densità inferiore a 0,02 giovani per pianta può essere considerato come un livello di vettore che dimostra un ottimale contenimento della popolazione, per cui è possibile evitare ulteriori interventi insetticidi.

Complessivamente il numero dei rilievi eseguiti è pari a 136 piante (come indicato nella scheda rilievo), il conteggio nel caso di densità 0.02 potrebbe concludersi al controllo della pianta 105.

Indicazioni pratiche sull'impiego della scheda

Conteggiare gli stadi giovanili di *S. titanus*, preferibilmente nelle prime ore del mattino, su 5 foglie per pianta in prossimità del ceppo. Sommare progressivamente i giovani osservati, e riportare il totale nella colonna "ninfe": nell'esempio riportato di seguito, sulle prime 6 piante sono stati osservati rispettivamente 2, 1, 2, 0, 0 e 0 giovani, e sulla scheda è stato riportato 2, 3, 5, 5, 5, 5.

Il campionamento può essere interrotto non appena il numero di forme giovanili conteggiate eguaglia o supera il rispettivo valore di stop: in questo caso alla pianta 14, il numero totale di giovani osservati (19) supera il corrispondente valore di stop (18,2). A quel punto, la densità in campo della cicalina, calcolata come rapporto tra il valore di stop e il numero di piante, è indicata nella colonna "densità" (in questo caso 1,30). La scheda ha un livello di precisione del 75%.

Esempio di compilazione della scheda di campionamento sequenziale.

| piante                                                                | ninfe | stop | densità |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| 1                                                                     | 2     | 2296 | 22963   |
| 2                                                                     | 3     | 1180 | 5899    |
| 3                                                                     | 5     | 799  | 2664    |
| 4                                                                     | 5     | 606  | 1515    |
| 5                                                                     | 5     | 489  | 978     |
| 6                                                                     | 5     | 411  | 684     |
| 7                                                                     | ...   | 364  | 506     |
| 8                                                                     | ...   | 311  | 389     |
| 9                                                                     | ...   | 278  | 309     |
| 5 < 41,1: continuare campionamento, densità < 6,84 giovani per pianta |       |      |         |
| 15                                                                    | ...   | 170  | 1.13    |

| piante                                                                 | ninfe | stop | densità |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| 1                                                                      | 2     | 2296 | 22963   |
| 2                                                                      | 3     | 1180 | 5899    |
| 3                                                                      | 5     | 799  | 2664    |
| 4                                                                      | 5     | 606  | 1515    |
| 5                                                                      | 5     | 489  | 978     |
| 6                                                                      | 5     | 411  | 684     |
| 7                                                                      | 9     | 364  | 506     |
| 8                                                                      | 12    | 311  | 389     |
| 9                                                                      | 12    | 278  | 309     |
| 10                                                                     | 15    | 251  | 251     |
| 11                                                                     | ...   | 229  | 208     |
| 12                                                                     | ...   | 211  | 176     |
| 13                                                                     | ...   | 195  | 150     |
| 14                                                                     | ...   | 182  | 130     |
| 15                                                                     | ...   | 170  | 1.13    |
| 15 < 25,1: continuare campionamento, densità < 2,51 giovani per pianta |       |      |         |

| piante                                                                   | ninfe | stop | densità |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| 1                                                                        | 2     | 2296 | 22963   |
| 2                                                                        | 3     | 1180 | 5899    |
| 3                                                                        | 5     | 799  | 2664    |
| 4                                                                        | 5     | 606  | 1515    |
| 5                                                                        | 5     | 489  | 978     |
| 6                                                                        | 5     | 411  | 684     |
| 7                                                                        | 9     | 364  | 506     |
| 8                                                                        | 12    | 311  | 389     |
| 9                                                                        | 12    | 278  | 309     |
| 10                                                                       | 15    | 251  | 251     |
| 11                                                                       | 16    | 229  | 208     |
| 12                                                                       | 17    | 211  | 176     |
| 13                                                                       | 17    | 195  | 150     |
| 14                                                                       | 19    | 182  | 1.30    |
| 15                                                                       |       | 170  | 1.13    |
| 19 > 18,2: interrompere campionamento, densità = 1,30 giovani per pianta |       |      |         |

Dal momento che si tratta di un insetto vettore di una fitopatia molto dannosa, la soglia di intervento risulta necessariamente molto bassa ed è fissata in 0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive di individui adulti in tutte le trappole del vigneto in tutto il periodo fine giugno-fine agosto.

Qualora il risultato del monitoraggio evidenziasse popolazioni maggiori del livello di soglia, sia per le forme giovanili che per gli adulti, è **obbligatorio effettuare immediatamente un secondo e, qualora anche il successivo controllo desse risultati analoghi, un terzo intervento insetticida con prodotti ad azione abbattente.**

B) Rilievo degli adulti mediante l'utilizzo di trappole cromotropiche

- Le trappole cromotropiche devono essere posizionate all'altezza della vegetazione prevalente: nei vigneti allevati a spalliera poco sopra la fascia grappolo.
- Devono essere posizionate a fine giugno e sostituite ogni 15 giorni.
- Per ogni vigneto occorre collocarne un numero variabile in base alla dimensione del campo (2 per vigneti con dimensioni inferiori a 0,5 ettari e 3 per ogni vigneto con dimensioni superiori 0,5 ettari, posizionando le trappole secondo una diagonale, una al centro, le altre ai confini del vigneto verso l'esterno in presenza di situazioni critiche quali vigneti trascurati, fondi valle, zone più fresche e ombrose).
- La lettura delle trappole, registrando il numero di adulti di *Scaphoideus titanus* totale per ciascun vigneto, deve avvenire con frequenza almeno quindicinale nel periodo inizio luglio - metà agosto, al fine di facilitare la decisione per eventuali interventi insetticidi d'urgenza.
- La data della lettura e il numero di insetti rilevato devono essere registrati per ogni vigneto sulla "Scheda registrazione adulti scafoideo" di seguito allegata, che deve essere conservata dal tecnico rilevatore.
- Le trappole sostituite, tenute separate e avvolte da pellicola trasparente, devono essere conservate per un anno a disposizione per eventuali controlli.

Scheda per la registrazione del rilievo sequenziale degli stadi giovanili di *Scaphoideus titanus*  
Anno \_\_\_\_\_

Area di monitoraggio: \_\_\_\_\_

Punto di conteggio: \_\_\_\_\_

Data del rilievo: \_\_\_\_\_ Rilevatore: \_\_\_\_\_

| piante | ninfe | stop  | densità | piante | ninfe. | stop | densità | piante | ninfe | stop | densità |
|--------|-------|-------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|------|---------|
| 1      |       | 229,6 | 229,63  | 47     |        | 5,7  | 0,12    | 92     |       | 3,0  | 0,03    |
| 2      |       | 118,0 | 58,99   | 48     |        | 5,6  | 0,12    | 93     |       | 2,9  | 0,03    |
| 3      |       | 79,9  | 26,64   | 49     |        | 5,6  | 0,11    | 94     |       | 2,9  | 0,03    |
| 4      |       | 60,6  | 15,15   | 50     |        | 5,4  | 0,11    | 95     |       | 2,9  | 0,03    |
| 5      |       | 48,9  | 9,78    | 51     |        | 5,3  | 0,10    | 96     |       | 2,9  | 0,03    |
| 6      |       | 41,1  | 6,84    | 52     |        | 5,2  | 0,10    | 97     |       | 2,8  | 0,03    |
| 7      |       | 35,4  | 5,06    | 53     |        | 5,1  | 0,10    | 98     |       | 2,8  | 0,03    |
| 8      |       | 31,1  | 3,89    | 54     |        | 5,0  | 0,09    | 99     |       | 2,8  | 0,03    |
| 9      |       | 27,8  | 3,09    | 55     |        | 4,9  | 0,09    | 100    |       | 2,8  | 0,03    |
| 10     |       | 25,1  | 2,51    | 56     |        | 4,8  | 0,09    | 101    |       | 2,7  | 0,03    |
| 11     |       | 22,9  | 2,08    | 57     |        | 4,7  | 0,08    | 102    |       | 2,7  | 0,03    |
| 12     |       | 21,1  | 1,76    | 58     |        | 4,6  | 0,08    | 103    |       | 2,7  | 0,03    |
| 13     |       | 19,6  | 1,50    | 59     |        | 4,6  | 0,08    | 104    |       | 2,6  | 0,03    |
| 14     |       | 18,2  | 1,30    | 60     |        | 4,5  | 0,07    | 105    |       | 2,6  | 0,02    |
| 15     |       | 17,0  | 1,13    | 61     |        | 4,4  | 0,07    | 106    |       | 2,6  | 0,02    |
| 16     |       | 16,0  | 1,00    | 62     |        | 4,4  | 0,07    | 107    |       | 2,6  | 0,02    |
| 17     |       | 15,1  | 0,89    | 63     |        | 4,3  | 0,07    | 108    |       | 2,6  | 0,02    |
| 18     |       | 14,3  | 0,79    | 64     |        | 4,2  | 0,07    | 109    |       | 2,5  | 0,02    |
| 19     |       | 13,6  | 0,71    | 65     |        | 4,2  | 0,06    | 110    |       | 2,5  | 0,02    |
| 20     |       | 12,9  | 0,65    | 66     |        | 4,1  | 0,06    | 111    |       | 2,5  | 0,02    |
| 21     |       | 12,3  | 0,59    | 67     |        | 4,0  | 0,06    | 112    |       | 2,5  | 0,02    |
| 22     |       | 11,8  | 0,54    | 68     |        | 4,0  | 0,06    | 113    |       | 2,4  | 0,02    |
| 23     |       | 11,3  | 0,49    | 69     |        | 3,9  | 0,06    | 114    |       | 2,4  | 0,02    |
| 24     |       | 10,8  | 0,45    | 70     |        | 3,9  | 0,06    | 115    |       | 2,4  | 0,02    |
| 25     |       | 10,4  | 0,42    | 71     |        | 3,8  | 0,05    | 116    |       | 2,4  | 0,02    |
| 26     |       | 10,0  | 0,39    | 72     |        | 3,8  | 0,05    | 117    |       | 2,4  | 0,02    |
| 27     |       | 9,7   | 0,36    | 73     |        | 3,7  | 0,05    | 118    |       | 2,3  | 0,02    |
| 28     |       | 9,3   | 0,33    | 74     |        | 3,7  | 0,05    | 119    |       | 2,3  | 0,02    |
| 29     |       | 9,0   | 0,31    | 75     |        | 3,6  | 0,05    | 120    |       | 2,3  | 0,02    |
| 30     |       | 8,7   | 0,29    | 76     |        | 3,6  | 0,05    | 121    |       | 2,3  | 0,02    |
| 31     |       | 8,5   | 0,27    | 77     |        | 3,5  | 0,05    | 122    |       | 2,3  | 0,02    |
| 32     |       | 8,2   | 0,26    | 78     |        | 3,5  | 0,04    | 123    |       | 2,3  | 0,02    |
| 33     |       | 8,0   | 0,24    | 79     |        | 3,4  | 0,04    | 124    |       | 2,2  | 0,02    |
| 34     |       | 7,8   | 0,23    | 80     |        | 3,4  | 0,04    | 125    |       | 2,2  | 0,02    |
| 35     |       | 7,5   | 0,22    | 81     |        | 3,4  | 0,04    | 126    |       | 2,2  | 0,02    |
| 36     |       | 7,3   | 0,20    | 82     |        | 3,3  | 0,04    | 127    |       | 2,2  | 0,02    |
| 37     |       | 7,2   | 0,19    | 83     |        | 3,3  | 0,04    | 128    |       | 2,2  | 0,02    |
| 38     |       | 7,0   | 0,18    | 84     |        | 3,3  | 0,04    | 129    |       | 2,2  | 0,02    |
| 39     |       | 6,8   | 0,17    | 85     |        | 3,2  | 0,04    | 130    |       | 2,1  | 0,02    |
| 40     |       | 6,6   | 0,17    | 86     |        | 3,2  | 0,04    | 131    |       | 2,1  | 0,02    |
| 41     |       | 6,5   | 0,16    | 87     |        | 3,1  | 0,04    | 132    |       | 2,1  | 0,02    |
| 42     |       | 6,3   | 0,15    | 88     |        | 3,1  | 0,04    | 133    |       | 2,1  | 0,02    |
| 43     |       | 6,2   | 0,14    | 89     |        | 3,1  | 0,03    | 134    |       | 2,1  | 0,02    |
| 44     |       | 6,1   | 0,14    | 90     |        | 3,0  | 0,03    | 135    |       | 2,1  | 0,02    |
| 45     |       | 5,9   | 0,13    | 91     |        | 3,0  | 0,03    | 136    |       | 2,0  | 0,02    |
| 46     |       | 5,8   | 0,13    |        |        |      |         |        |       |      |         |

**Scheda per la registrazione del numero di adulti di *Scaphoideus titanus* catturati con le trappole cromotattiche**

Anno \_\_\_\_\_

Area di monitoraggio: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

[illegible]